

Operation for hæmorider

Patientinformation



26. maj 2020
Skrevet af: Lars Lindegaard
Version 1.0

Operation for hæmorider

Patientinformation

Før operation på Gildhøj Privathospital

Det er vigtigt, at du er godt forberedt før din operation. Vi anbefaler derfor, at du læser denne pjece grundigt, inden du møder på hospitalet.

Vigtigt at vide før din operation

Operationen bliver aflyst og udsat på ubestemt tid hvis;

- Fastereglerne ikke er overholdt.
- Du føler dig forkølet, har feber eller er i penicillin behandling.

Hvis du er i tvivl, så RING.

Fasteregler:

Mad: Før operationen skal du **FASTE** og du må derfor **intet** spise, **ikke** indtage mælkeprodukter, alkohol, juice eller anden saft med frugtkød de sidste **6 timer før**, du skal møde på hospitalet.

Drikke: Vi anbefaler at du drikker vand eller saft uden frugtkød og kun dette, indtil **2 timer før** dit mødetidspunkt.

Du er velkommen til at børste tænder om morgenen, tygge tyggegummi og der er ingen restriktioner vedrørende rygning før bedøvelse.

Hvad er hæmorider

Hæmorider er en slags åreknuder ved endetarmsåbningen.

Symptomer

Blødning er det mest almindelige symptom, ofte som "kummesprøjt" i forbindelse med toiletbesøg. Desuden kan en hæmoride genere ved at hænge ud af endetarmsåbningen.

Man kan få en akut blodansamling i en hæmoride. Dette kaldes en tromboseret hæmoride. En tromboseret hæmoride er yderst smertefuld og den mest almindelig årsag til akut henvisning. En blodansamling i en hæmoride er ufarlig.

Tilstanden behandles med hæmoride creme, smertestillende medicin samt evt. afføringsmiddel.

Operation for hæmorider

Vi udfører 2 forskellige operationer for hæmorider. Det er en kombination af hæmoridernes beliggenhed og størrelse, som vil afgøre, hvilket indgreb der skønnes bedst.

Du skal være opmærksom på, at dine hæmorider kan have ændret sig, fra den dag du ses i vores ambulatorium, til dagen hvor du skal opereres. Ydermere kan hæmoriderne se meget anderledes ud, når du er bedøvet.

McGivney elastikker

Det mindste indgreb - som ikke kræver fuld bedøvelse - består i, at kirurgen med en lille kikkert sætter elastikker på dine hæmorider. Dette gøres ved den første undersøgelse på Gildhøj.

Milligans operation

Et lidt større indgreb hvor hæmoriden og noget af den slimhinde der dækker hæmoriden fjernes. Indgrebet udføres som regel i fuld bedøvelse. Det er et ambulat indgreb, og du kommer hjem samme dag.

Efter operationen

Det er kirurgen der beslutter, om du skal til kontrol hos os efter operationen. I dagene efter en operation for hæmorider kan der være lidt blødning fra endetarmen. Ligeledes er der som regel nogle smerter. Infektion er sjælden.

Det er derfor vigtigt, at du efter indgrebet holder din afføring lind ved at indtage rigelig væske og eventuelt supplere med afføringsmiddel. Afføringsmiddel fås i håndkøb. Efter toiletbesøg er håndbrusning mest skånsomt.

Du bør desuden tage almindelig smertestillende, men helst ikke morfin eller morfinlignende præparater, da disse giver "hård mave".

Er der større blødning, ubærlige smerter eller tegn på infektion i form af tiltagende hævelse, smerteforværring, pus og eventuelt feber, skal du kontakte Gildhøj eller din egen læge.

Transport

Du må ikke køre bil på operationsdagen. Bilkørsel kan genoptages herefter, dog under forudsætning af, at du ikke tager stærk smertestillende.

Kontakt GHP Gildhøj

Gildhøj Privathospital København

Brøndbyvester Boulevard 16
DK-2605 Brøndby

Tel. (+45) 43 43 92 92

Fax. (+45) 43 43 92 93

E-mail: kontakt@gildhoj.dk

Telefontid

Mandag - torsdag: kl. 8-17

Fredag: kl. 8-16